

**Promociones válidas hasta 31-10-2020**

**(+34) 639 620 774**

**www.clarben.com**

Solicite cualquiera de estos productos a su distribuidor habitual

## ANESTESIA INYECTABLE



¡Única!  
1:100.000

**LIDOCAÍNA + EPINEFRINA**  
Ref: 01-002



¡Única!  
1:50.000

**LIDOCAÍNA + EPINEFRINA**  
Ref: 01-003



**MEPIVACAÍNA**  
Ref: 01-004



**ARTICAÍNA + EPINEFRINA**  
Ref: 01-008



**ARTICAÍNA + EPINEFRINA**  
Ref: 01-009



\* Pedido mínimo.  
**Puede combinar moléculas.**


## OFERTA ESPECIAL



¡Única!  
1:100.000



¡Única!  
1:50.000



**5+5**  
\* El pedido mínimo debe incluir:  
**2 Cajas de Isogaine 3%**

Por la compra de  
**10 Cajas**  
de Anestesia inyectable  
a elegir\*

llévese además  
**hasta 10 Batas**  
desechables

**POR**  
**3,00** €/u

**Valoradas en 15,00€**



Unidades limitadas

Ref: PRPK151

**OCTOCAINE 1:100.000 - OCTOCAINE 1:50.000** COMPOSICIÓN: OCTOCAINE 1:100.000 cada ml de solución contiene: Lidocaína (D.C.I.) clorhidrato 20,0 mg, epinefrina (D.C.I.) 0,01 mg, cloruro sódico, bisulfito sódico, agua para inyección. OCTOCAINE 1:50.000 cada ml contiene: Lidocaína (D.C.I.) clorhidrato 20,0 mg, epinefrina (D.C.I.) 0,02 mg, cloruro sódico, bisulfito sódico, agua para inyección. **INDICACIONES:** Anestesia local en odontología, por infiltración o bloqueo troncular. **CONTRAINDICACIONES:** Casos de hipersensibilidad a anestésicos locales tipo amida, litrotoxicosis, diabetes, arteriosclerosis, hipertensión, insuficiencia cardíaca y pacientes con insuficiencia cerebral. Está absolutamente contraindicada la inyección intravascular. **PRECAUCIONES:** Deben tomarse las precauciones adecuadas en gestantes, hipertensos, adrenergicos, cardiacos, pacientes con insuficiencia en el seno cerebral, litrotoxicos, diabetes u otros pacientes que puedan resultar afectados por el componente vasoconstrictor. **ADVERTENCIAS:** Sobre los excipientes: este medicamento contiene bisulfito sódico, por lo que puede causar reacciones tipo alérgico en pacientes susceptibles, asmáticos o alérgicos. Advertencia para deportistas: Puede dar dopaje positivo. **INTERACCIONES:** Sustancias regularas de la presión arterial, IMAO, antidepresivos tricíclicos, fenotiazinas. **REACCIONES ADVERSAS:** Al igual que todos los anestésicos locales pueden originar trastornos nerviosos centrales (nevosismo e insonnia o somnolencia, visión borrosa, mareos, convulsiones, incontinencia y parada respiratoria) y/o sobre el sistema cardiovascular (hipotensión, bradicardia y depresión del miocárdio), dependiendo de la dosis. **INTOXICACIÓN:** Generalmente se produce por el paso de la solución al torrente circulatorio. Si durante la inyección se presentan los primeros síntomas de efectos adversos o de intoxicación descritos anteriormente, cesar la administración, colocar al paciente en posición horizontal, mantener libres las vías respiratorias, controlar el pulso y la tensión arterial. **INCOMPATIBILIDADES:** No se conocen. **PRESENTACIÓN:** OCTOCAINE 1:100.000: Envase con 50 ampollas de 1,8 ml (caja roja). OCTOCAINE 1:50.000: Envase con 50 ampollas de 1,8 ml (caja verde). **ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA:** No sujeta a régimen de financiación por el SNS. **LABORATORIOS CLARBEN S.A. C/Alaura, 111. 28043 Madrid. MEGANEST 1:100.000 - MEGANEST 1:200.000** COMPOSICIÓN: MEGANEST 1:100.000 cada ml de solución contiene: Articaina (D.C.I.) clorhidrato 40,0 mg, Epinefrina (D.C.I.) 0,018 mg, cloruro sódico, metabisulfito sódico, ácido cítrico, agua para inyección. MEGANEST 1:200.000 cada ml contiene: Articaina (D.C.I.) 40,0 mg, epinefrina (D.C.I.) 0,009 mg, cloruro sódico, metabisulfito sódico, ácido cítrico, agua para inyección. **INDICACIONES:** Anestesia local en odontología, por infiltración o bloqueo troncular. **CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad a anestésicos locales tipo amida, litrotoxicosis, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca y pacientes con insuficiencia cerebral. Está absolutamente contraindicada la inyección intravascular. **PRECAUCIONES:** Deben administrarse con precaución a pacientes con distensión hepática, distensión renal, epilepsia, shock, alteraciones de la conducción cardíaca o miastenia gravis, lesiones miocárdicas, hipertensión y mujeres durante el embarazo y lactancia. **ADVERTENCIA:** En deportistas puede dar dopaje positivo. **INTERACCIONES:** IMAO, antidepresivos tricíclicos, 8-bloqueantes, fármacos que modifican las propiedades eléctricas del corazón (antiarrítmicos, especialmente del grupo I, digitálicos y otros inotrópicos), glicosídeos y relajantes neuromusculares. **REACCIONES ADVERSAS:** Al igual que todos los anestésicos locales pueden originar trastornos nerviosos centrales (nevosismo e insonnia o somnolencia, visión borrosa, mareos, convulsiones, incontinencia y parada respiratoria) y/o sobre el sistema cardiovascular (hipotensión, bradicardia y depresión del miocárdio), dependiendo de la dosis. **SOBREDOSIFICACIÓN:** Se puede producir por una inyección intravascular accidental o por administrar una dosis excesiva. Si durante la inyección se presentan los primeros síntomas de efectos adversos o de intoxicación descritos anteriormente, cesar la administración, colocar al paciente en posición horizontal, mantener libres las vías respiratorias, controlar el pulso y la tensión arterial. **INCOMPATIBILIDADES:** No se conocen. **PRESENTACIÓN:** MEGANEST 1:100.000 y MEGANEST 1:200.000 se presentan en un envase que contiene 50 ampollas de 1,8 ml. **ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA:** No sujeta a régimen de financiación por el SNS. **LABORATORIOS CLARBEN S.A. C/Alaura, 111. 28043 Madrid. ISOGAINE 3%** COMPOSICIÓN: Cada ml de solución contiene: Mepivacaína (D.C.I.) clorhidrato 30,0 mg, cloruro sódico, agua para inyección. **INDICACIONES:** Anestesia local en odontología, por infiltración o bloqueo troncular. **POSOLÓGIA:** Adultos: 1 ampolla clínica (1,8 ml), puede aumentarse a 2, si fuera necesario. Niños: 0,5 a 1,0 ml. **Dosis máxima recomendada:** 5,5 ampollas clínicas. **CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad a anestésicos locales tipo amida. Está absolutamente contraindicada la inyección intravascular. **PRECAUCIONES:** Enfermedad o disfunción hepática, historia o predisposición a la hipertensión arterial, hipertensión renal, niños, ancianos, enfermos con enfermedad crónica o muy debilitados, pacientes con problemas de ritmo y bloqueos cardiacos, embarazo y lactancia. **ADVERTENCIA:** En deportistas puede dar dopaje positivo. **INTERACCIONES:** Antiarrítmicos, psicofármacos, anticonvulsivos, consumo excesivo de alcohol. **REACCIONES ADVERSAS:** Al igual que todos los anestésicos locales pueden originar trastornos nerviosos centrales (nevosismo e insonnia o somnolencia, visión borrosa, mareos, convulsiones, incontinencia y parada respiratoria) y/o sobre el sistema cardiovascular (hipotensión, bradicardia y depresión del miocárdio), dependiendo de la dosis. **SOBREDOSIFICACIÓN:** Se puede producir por una inyección intravascular accidental o por administrar una dosis excesiva. Si durante la inyección se presentan los primeros síntomas de efectos adversos o de intoxicación descritos anteriormente, cesar la administración, colocar al paciente en posición horizontal, mantener libres las vías respiratorias, controlar el pulso y la tensión arterial. **INCOMPATIBILIDADES:** No se conocen. **PRESENTACIÓN:** Envase con 50 ampollas de 1,8 ml. **Especialidad farmacéutica no sujeta a régimen de financiación por el SNS. LABORATORIOS CLARBEN S.A. C/Alaura, 111. 28043 Madrid.**  
Valor oferta Alcaide Corte dental 20€. Valor oferta Smartwatch 20€. Valor oferta Ecovac 80€. Valor oferta Termómetro clínico 70€.



### Toallitas desinfectantes

Toallitas desinfectantes para todas las superficies de productos sanitarios.



Bote 100 uds  
Ref: 07-011

**4,15** €/u  
~~12,25~~ €/u.



Reposición 100 uds  
Ref: 07-017

**3,50** €/u  
~~8,90~~ €/u.

### Desinfectantes de superficies e instrumental

Desinfectante concentrado universal (2 L) que permite la limpieza manual del instrumental clínico y de las superficies bidón (5L) y spray (600mL)



Garrafa 5 L  
Ref: 07-013

**50,75** €/u  
~~68,25~~ €/u.



Envase 2 L  
Ref: 07-015

**22,90** €/u  
~~53,75~~ €/u.



Spray 600ml  
Ref: 07-012

**10,90** €/u  
~~22,60~~ €/u.

### Bactericida detergente BIOMAN 5L



Alto poder desinfectante con acción detergente, altamente activo frente a un amplio espectro de bacterias. Especialmente formulado para su uso en la limpieza y desinfección por contacto de superficies y utensilios fuertemente contaminados en la industria alimentaria, hostelería e higiene institucional.

Ref: 07-041

**28,50** €/u  
~~59,45~~ €/u.

### Gel Hidroalcohólico 5 L



Formulado higienizante hidroalcohólico (70 % v/v alcohol) en forma gel, sin perfume y de rápida evaporación. Especialmente recomendado para personas que necesitan garantizar una higiene máxima permanente de las manos sin la necesidad del lavado continuado de las mismas.

Ref: 07-032

**18,90** €/u  
~~29,98~~ €/u.

# Hurricane® BENZOCAÍNA 20%



**Gel 30 mL**  
Ref: 01-010

**Por 2**  
**PRECIO RESULTANTE**  
**26,10** €/u  
Por 1: 29,60 €/u.

Comprando  
**2 Hurricane® Gel 30 mL**  
llévase  
**1 caja de Isogaine 3%**



**POR**  
**5,00** €/u

Unidades limitadas

Ref: PRPK157



**Spray 60 mL**  
Ref: 01-006

**19,40** €/u  
~~33,68 €/u.~~



Con dosificador

**Gel 50 mL**  
Ref: 01-001

**Por 2**  
**PRECIO RESULTANTE**  
**35,95** €/u  
Por 1: 38,50 €/u.

Comprando  
**2 Hurricane® Gel 50 mL**  
llévase  
**Mascarillas FFP2**  
hasta 10 mascarillas

**POR**  
**1,00** €/u

Valorado en 8,00€

Unidades limitadas

Ref: PRPK127

**Para aftas, llagas y heridas bucales.**



**Spray 5 mL** Ref: 01-011  
**Gel 6 mL** Ref: 01-021

**6,50** €/u

## LA ANESTESIA MULTIUSOS



**ENDODONCIA:**  
Aplicando una pequeña cantidad de Hurricane en una punta endodóntica (papel, lima, etc) se consigue anestesia las fibras nerviosas en 30 segundos.



**LIMPIEZA/DETARTRAJE:**  
Aplique Hurricane sobre la encía, alrededor del diente, para realizar limpiezas o detartrajes y retirar surtiras sin dolor.



**TOMA DE IMPRESIÓN:**  
Aplique Hurricane Spray directamente sobre la parte externa de los tejidos blandos de la cavidad oral y facilite la toma de impresión.



**EXTRACCIÓN DE DIENTES TEMPORALES:**  
Aplique Hurricane sobre la encía antes de proceder con la extracción de las piezas dentales.



**PERIODONCIA:**  
Evite inyectar nuevamente anestesia, utilice Hurricane Gel mediante jeringa o bien Hurricane Spray sobre la encía donde se desea utilizar el atacador y en pocos segundos podrá continuar trabajando.



**PREINYECCIÓN:**  
Su uso más extendido y por lo que no debe faltar en ninguna clínica. Evite esa mala "primera impresión" para el paciente que produce la anestesia inyectable, utilizando previamente Hurricane en la zona donde vaya a realizar el pinchazo, el paciente no sentirá ningún dolor y le quedará un agradable sabor en la boca.



**ORTODONCIA:**  
Utilice Hurricane siempre que:  
- Retire y coloque bandas.  
- Retire y coloque brackets.  
- Y evite las molestias a su paciente durante el proceso.



**CORTAR TEJIDO:**  
Utilice Hurricane en la zona de la mucosa donde se desea realizar la pequeña incisión, la zona quedará inmediatamente anestesiada.

**Hurricane spray 200 mg/ml** solución para pulverización bucal. COMPOSICIÓN: Cada 1 mL contiene Benzoína 200 mg, Sacarina Polietilenglicol, aroma de cereza. FORMA FARMACÉUTICA: Solución para pulverización bucal. DATOS CLÍNICOS: Indicación Alivio local del dolor dental o de boca, como el producido por el roce de prótesis, extracciones, pequeñas heridas bucales, aftas y pequeñas llagas en adultos y niños a partir de 6 años. Psicología: Adultos y adolescentes: aplicar en la zona a tratar, mediante pequeños toques, como máximo 3 ó 4 veces al día. Niños de 6-12 años: solo bajo supervisión de un adulto. Niños de 2-6 años: bajo control médico. Niños menores de 2 años: No está recomendado su uso. Destapar el frasco y aplicar sobre la zona que se desea anestésico, pulsando la válvula durante medio segundo ó el tiempo necesario para que se despegue el algodón y mantenerlo aplicado en la zona durante varios minutos. Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la benzoína, a otros anestésicos locales derivados del ácido p-aminobenzoico (PABA) o a alguno de los excipientes. Advertencias y precauciones: No se debe comer o beber mientras persista el entumecimiento, debido al riesgo de mordedura la lengua o la mucosa bucal y de atragantarse. Este medicamento puede producir dermatitis de contacto y disgeusia. Se debe aconsejar a los pacientes que informen inmediatamente los síntomas y signos de metahemoglobinemia que son: dolor de cabeza, mareos, respiración superficial, náuseas, fatiga o taquicardia. Evitar el contacto. No ingerir. En ningún caso se debe aplicar este medicamento más de 4 veces al día. En personas con asma, bronquitis, enfisema el uso de este medicamento puede aumentar el riesgo por complicaciones debidas a metahemoglobinemia. En personas mayores de 65 años y en los pacientes debilitados el riesgo de desarrollar metahemoglobinemia está incrementado. En personas con defectos congénitos tipo deficiencia de glucosa-6-fosfatasa, enfermedad hemoglobinaria-M, deficiencia de ADH-metahemoglobinemia reducida y deficiencia de piruvato-quinasa el riesgo de desarrollar metahemoglobinemia está incrementado. Interacciones: Sulfamidas: antagoniza el efecto antibacteriano de las sulfamidas. Heliouronidas: incrementa la incidencia de la reacción sistémica de la benzoína. Inhibidores de la colestestasa: inhibe el metabolismo de la benzoína. Puede existir reacción cruzada de sensibilización, incluyendo anafilaxia, entre la benzoína y otros anestésicos locales tipo éster, sulfamidas, flocidas, colorante tipo pararamino, glicero paraminobenzoato (glicero PABA), ácido paraminobenzoico, ácido paraminobenzoico y meprocaina. En personas sensibles a la benzoína, los tintes de pelo del tipo parafernalia pueden provocar una dermatitis de contacto grave. Interacciones con pruebas de diagnóstico: No utilizar benzoína 72 horas antes de la realización de la prueba de punción pancreática con bentrimidina ya que existe la posibilidad de interferencia en el resultado de la misma. Fertilidad, embarazo y lactancia es preferible evitar su uso. Reacciones adversas: Trastornos de la sangre y del sistema linfático: Metahemoglobinemia principalmente debido a un uso prolongado y también en caso de sobredosis. Las personas con defectos congénitos incluyendo deficiencia de glucosa-6-fosfatasa, enfermedad hemoglobinaria-M, deficiencia de ADH-metahemoglobinemia reducida y deficiencia de piruvato-quinasa el riesgo de desarrollar metahemoglobinemia está incrementado. Trastornos del sistema inmunológico: Paraneuro: Urticaria, edema, reacción anafiláctica (dermatitis de contacto). Reacciones cruzadas con otros anestésicos locales tipo éster: Fotoseñalabilidad. Trastornos gastrointestinales: Por un uso prolongado se han notificado: Disgeusia, mal sabor de boca, deshidratación de las mucosas y dificultades para tragar. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Sensación de quemado. Reacción: Urticaria, edema, reacción anafiláctica (dermatitis de contacto). Reacciones cruzadas con otros anestésicos locales tipo éster: Fito sensibilidad. Por un uso prolongado se han notificado: Disgeusia, mal sabor de boca, deshidratación de las mucosas y dificultades para tragar. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Sensación de quemado bucal. El contacto prolongado de la benzoína con las membranas mucosas puede producir deshidratación del epitelio y endurecimiento de las mucosas. Sobredosis: Las sobredosis de benzoína puede producir metahemoglobinemia, caracterizada por coloración azul de piel y mucosas. Las manifestaciones clínicas de la metahemoglobinemia dependen de la concentración de metahemoglobina en sangre; entre un 15 y un 20 %, se produce cianosis; con un nivel de metahemoglobina superior al 20%, fatiga, cefalea, Náuseas y vómitos con nivel superior al 40%. Cuando los niveles de metahemoglobina son superiores al 55% incremento de la sudoración, fibrilación atrial, taquicardia, hipotensión e infarto de miocardio, alteraciones en el nivel de conciencia. La metahemoglobinemia se puede tratar, entre otros, mediante infusión intravenosa de solución de azul de metileno al 1%. Incompatibilidades: No procede. Envase de 6 mL, 30ml. Sin receta médica. LABORATORIOS CLARIBEN S.A. C/Alcañal 111-29043 Madrid.

**HURRICAINA® 200 mg/ml Gel Bucal** COMPOSICIÓN: cada 100 mL contiene Benzoína (D.C.I.) 200 mg, Sacarina Polietilenglicol, aroma de cereza. FORMA FARMACÉUTICA: Gel. DATOS CLÍNICOS: Indicación: Para el alivio local del dolor dental o de boca, como el producido por roce de prótesis, extracciones, pequeñas heridas bucales, aftas y pequeñas llagas en adultos y niños a partir de 6 años. Psicología: Adultos y adolescentes: aplicar en la zona a tratar, mediante pequeños toques, como máximo 3 ó 4 veces al día. Niños de 6-12 años: solo bajo supervisión de un adulto. Niños de 2-6 años: bajo control médico. Niños menores de 2 años: No está recomendado su uso. Destapar el frasco y aplicar sobre la zona que se desea anestésico, pulsando la válvula durante medio segundo ó el tiempo necesario para que se despegue el algodón y mantenerlo aplicado en la zona durante varios minutos. Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la benzoína, a otros anestésicos locales derivados del ácido p-aminobenzoico (PABA) o a alguno de los excipientes. Advertencias y precauciones: No se debe comer o beber mientras persista el entumecimiento, debido al riesgo de mordedura la lengua o la mucosa bucal y de atragantarse. Este medicamento puede producir dermatitis de contacto y disgeusia. Se debe aconsejar a los pacientes que informen inmediatamente los síntomas y signos de metahemoglobinemia que son: dolor de cabeza, mareos, respiración superficial, náuseas, fatiga o taquicardia. Evitar el contacto con los ojos. No ingerir. En ningún caso se debe aplicar este medicamento más de 4 veces al día. En personas con asma, bronquitis, enfisema el uso de este medicamento puede aumentar el riesgo por complicaciones debidas a metahemoglobinemia. En personas mayores de 65 años y en los pacientes debilitados el riesgo de desarrollar metahemoglobinemia está incrementado. En personas con defectos congénitos tipo deficiencia de glucosa-6-fosfatasa, enfermedad hemoglobinaria-M, deficiencia de ADH-metahemoglobinemia reducida y deficiencia de piruvato-quinasa el riesgo de desarrollar metahemoglobinemia está incrementado. Interacciones: Sulfamidas: antagoniza el efecto antibacteriano de las sulfamidas. Heliouronidas: incrementa la incidencia de la reacción sistémica de la benzoína. Inhibidores de la colestestasa: inhibe el metabolismo de la benzoína. Puede existir reacción cruzada de sensibilización, incluyendo anafilaxia, entre la benzoína y otros anestésicos locales tipo éster, sulfamidas, flocidas, colorante tipo pararamino, glicero paraminobenzoato (glicero PABA), ácido paraminobenzoico, ácido paraminobenzoico y meprocaina. En personas sensibles a la benzoína, los tintes de pelo del tipo parafernalia pueden provocar una dermatitis de contacto grave. Interacciones con pruebas de diagnóstico: No utilizar benzoína 72 horas antes de la realización de la prueba de punción pancreática con bentrimidina ya que existe la posibilidad de interferencia en el resultado de la misma. Fertilidad, embarazo y lactancia Como medida de precaución, es preferible evitar su uso durante el embarazo. No debe utilizarse durante la lactancia. Reacciones adversas: Trastornos de la sangre y del sistema linfático: Metahemoglobinemia principalmente debido a un uso prolongado y también en caso de sobredosis. Las personas con defectos congénitos incluyendo deficiencia de glucosa-6-fosfatasa, enfermedad hemoglobinaria-M, deficiencia de ADH-metahemoglobinemia reducida y deficiencia de piruvato-quinasa, el riesgo de desarrollar metahemoglobinemia está incrementado. Trastornos del sistema inmunológico: Paraneuro: Urticaria, edema, reacción anafiláctica (dermatitis de contacto). Reacciones cruzadas con otros anestésicos locales tipo éster: Fito sensibilidad. Por un uso prolongado se han notificado: Disgeusia, mal sabor de boca, deshidratación de las mucosas y dificultades para tragar. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Sensación de quemado bucal. El contacto prolongado de la benzoína con las membranas mucosas puede producir deshidratación del epitelio y endurecimiento de las mucosas. Sobredosis: Puede producir metahemoglobinemia, caracterizada por coloración azul de piel y mucosas. Las manifestaciones clínicas de la metahemoglobinemia dependen de la concentración de metahemoglobina en sangre; entre un 15 y un 20 %, se produce cianosis; con un nivel de metahemoglobina superior al 20% fatiga, cefalea, Náuseas y vómitos con nivel superior al 40%. Cuando los niveles de metahemoglobina son superiores al 55% incremento de la sudoración, fibrilación atrial, taquicardia, hipotensión e infarto de miocardio, alteraciones en el nivel de conciencia. La metahemoglobinemia se puede tratar, entre otros, mediante infusión intravenosa de solución de azul de metileno al 1%. Incompatibilidades: No procede. Envase de 6 mL, 30ml. Sin receta médica. LABORATORIOS CLARIBEN S.A. C/Alcañal 111-29043 Madrid.

## BRACKETS ROTH

### CERÁMICOS

Brackets hipóalérgicos que garantizan una estética natural sobre cualquier tonalidad en el tratamiento. Sistema Roth con ganchos en 3°, 4°, 5°.



Kit de 20 brackets  
0.018" Ref: 03-042  
0.022" Ref: 03-043

**53,00** €/u  
~~205,40~~ €/u.

### METÁLICOS

Brackets elaborados con acero quirúrgico inoxidable de alta calidad. Sistema Roth con ganchos en 3°, 4°, 5°.



Kit de 20 brackets  
0.018" Ref: 03-040  
0.022" Ref: 03-041

**20,95** €/u  
~~49,40~~ €/u.



Valorado en  
**119,90€**

Comprando  
**Brackets roth** a elegir  
llévase  
**1 Alicata de Corte Distal**

**GRATIS**

Unidades limitadas

Cerámicos: PRPK144  
Metálicos: PRPK145

## ARCOS DE ORTODONCIA Clarben



\* Consultar las referencias en  
[www.clarben.com](http://www.clarben.com)

### ARCOS NI-TI SÚPER ELÁSTICOS

Bolsa con 10 unidades

REDONDOS

**7,05** €/u  
~~14,55~~ €/u.

RECTANGULARES

**9,25** €/u  
~~21,15~~ €/u.

### ARCOS NI-TI TÉRMICOS

Bolsa con 5 unidades

REDONDOS

**9,00** €/u  
~~35,45~~ €/u.

RECTANGULARES

**11,10** €/u  
~~45,15~~ €/u.

### ARCOS NI-TI ESTÉTICOS

Bolsa con 5 unidades

REDONDOS

**24,25** €/u  
~~36,65~~ €/u.

## CAJAS PARA MODELOS



Caja plegada de cartón que ayuda a mantener en orden los modelos de escayola.

Cajas para modelos con 3 compartimentos.  
100 Cajas plegadas en cada caja.

Ref: 03-020

**70,80** €/u  
~~74,20~~ €/u.

## Ligaduras en Barras Individuales Clarben



Antialérgicas. Bolsa con 40 módulos x 26 unidades.

1040 ligaduras.

Plata	03-055	Rosa	03-058
Transparente	03-056	Azul	03-059
Surtido	03-057		

**9,90** €/u  
~~20,70~~ €/u.

## OCTOPLUS® Agujas



Caja con 100 unidades.

Ref: 01-016	30 G Corta	0,3 x 25mm	Infiltrativa	Amarilla
Ref: 01-017	30 G X Corta	0,3 x 16mm	Intraligamentosa	Verde
Ref: 01-018	27 G Larga	0,4 x 38mm	Troncular	Gris
Ref: 01-020	30 G Corta	0,3 x 21mm	Infiltrativa	Roja

Por 7

PRECIO RESULTANTE

**7,95** €/u

Por 1: **8,50** €/u.

~~15,30~~ €/u

Comprando  
**7 Cajas de Agujas Octopus®**

(a elegir)

llévase

**1 Gafas de protección GOGGLE**



POR  
**2,95** €/u

Unidades limitadas

**Valoradas  
en 17,30€**

Ref: PRPK140

## OCTOCOLAGEN® Esponjas hemostáticas

Esponja hemostática de Colágeno Hidrolizado y estéril en **envase individual**, especialmente indicada en cirugías por su alto poder hemostático y cicatrizante.

Caja con 40 esponjas.

Ref: 06-050

**24,20** €/u

~~47,85~~ €/u.



Caja con 10 esponjas.

Ref: 06-052

**NUEVO**

**8,85** €/u

~~18,65~~ €/u.



## CALZAS CUBRECALZADO

Calzas cubrecalzado de tejido no tejido.  
Talla única. Color azul.  
Bolsas de 100 uds.

Ref: 14-013



**SÚPER OFERTA**

**10,95** €/u

~~19,95~~ €/u.

Comprando **5** bolsas de  
100 unidades de **Calzas  
Cubrecalzados**

llévase

**1** Dispensador  
cubrecalzado



**Valorado  
en  
84,69€**

POR  
**29,95** €/u

Unidades limitadas  
Ref: PRPK143

## PANTALLA FACIAL

Pantalla facial abatible. Esta pantalla cuenta con un gran visor transparente y adaptable a la cabeza para tu protección ante partículas.

Ref: 14-011

**4,70** €/u

~~7,90~~ €/u.



## Kit preparación de porcelana Clarben



Permite preparar superficies de porcelana para su posterior reparación.

1,2 mL Kool-Dam  
1,2 mL Dry-Rite  
1,2 mL Silano  
1,2 mL Porcelain Etch Gel  
Cánulas

Ref: 04-002

**39,40** €/u  
~~70,80~~ €/u.



Comprando

**1** Kit preparación de porcelana

llévase

**1** GEL DE MANOS  
Hidroalcohólico 500 ml

Máximo 5

POR  
**3,00** €/u

**Valorado en 9,83€**

Unidades limitadas



Ref: PRPK133

## Gel grabador de porcelana Clarben



**Ácido hidrofúorhídrico** indicado para el grabado de porcelana.

4 Jeringas de 1,2 mL con 9,6% de ácido hidrofúorhídrico.  
8 Cánulas TIPS

Ref: 04-011

**21,90** €/u  
~~65,35~~ €/u.

## Silano Clarben



Indicado para preparar a superficie de porcelana e permitir a adesão de compósitos e outras resinas orgánicas.

4 Jeringas de 1,2 mL de silano.  
8 Cánulas TIPS.

Ref: 04-021

**21,90** €/u  
~~65,35~~ €/u.

## EDTA

**EDTA** Solución al 17%.

**EDTA PLUS**, gel con **Peróxido de Carbamida** al 10%.



Bote 50 mL

Ref: 02-033

**10,25** €/u  
~~42,45~~ €/u.



2 Jeringas de 3 mL  
6 Cánulas

Ref: 02-032

**14,75** €/u  
~~24,05~~ €/u.

## OCTOCANAL® Clarben

**Hidróxido de calcio**, con sulfato de bario premezclado en pasta que no endurece. Con efecto antibacteriano y libre de yodoformo. Radiopaco.



1 Jeringa de 3g

10 cánulas flexibles.

Ref: 02-003

**19,10** €/u  
~~66,95~~ €/u.

## OCTACID® Kit Gel ácido grabador



4 Jeringas de 1,2 mL  
8 Cánulas  
Ref: 04-017

**8,95** €/u  
~~26,10~~ €/u.

Comprando  
**2 Octacid® Kit**  
llévese  
**1 Gafas de protección**



Valoradas  
en **17,30€**

**POR**  
**3,95** €/u

Máximo 3 packs.  
Unidades limitadas

Ref: PRPK146

## OCTACID® JUMBO Ácido

Ácido ortofosfórico al 37%.

Tixotrópico.

2 Jeringas de **25 mL**  
2 Jeringas de **3 mL**

8 Cánulas

Ref: 04-019

**35,40** €/u  
~~147,90~~ €/u.



Comprando  
**1 Octacid® Jumbo**  
llévese

**1 GEL DE MANOS**  
Hidroalcohólico 250 ml  
Máximo 5



Con dispensador

Valorado en  
**9,83€**

**POR**  
**1,50** €/u

Unidades limitadas

Ref: PRPK128

## OCTACID® Green 12g Ácido



1 Jeringa de 12 g  
10 Cánulas

Ref: 04-072

**5,70** €/u  
~~25,25~~ €/u.

## OCTACID® Green Ácido



4 Jeringas de 1,2 mL  
8 Cánulas

Ref: 04-071

**8,90** €/u  
~~23,05~~ €/u.

## Blu-Gel Ácido



Ácido ortofosfórico al 37%.  
Tixotrópico.

3 Jeringas de 3 mL  
8 Cánulas

Ref: 04-014

**10,80** €/u  
~~30,10~~ €/u.

## OCTOBOND® LC Adesivo

Adesivo universal para  
adherir composites y  
compómeros tanto a  
esmalte como a la dentina.

Bote de 5 ml.

Ref: 04-039

**24,75** €/u  
~~47,40~~ €/u.



Comprando  
**1 Octobond®**  
llévese  
**1 Octacid 12g**



**POR**  
**8,65** €/u

Unidades limitadas

Ref: PRPK159

## OCTOLIGHT® Composite

Composites nanohíbridos fotopolimerizables altamente estéticos y con excelentes resultados de polimento, ofrece mayor resistencia a la abrasión y fracturas.

### OCTOLIGHT®



Jeringa de 4 g.  
**Ref: 04-051 A1**  
**Ref: 04-052 A2**  
**Ref: 04-053 A3**  
**Ref: 04-054 A3.5**

**24,00** €/u  
~~56,35~~ €/u.

### OCTOLIGHT® Flow



Jeringa de 2 g.  
**Ref: 04-062 Flow A2**  
**Ref: 04-063 Flow A3**  
**Ref: 04-064 Flow A3.5**

**14,00** €/u  
~~44,60~~ €/u.

Comprando

**2** composite Octolight® ó **3** composite Octolight® Flow  
 llévase  
**1 Caja (50 uds) Mascarillas azules de 3 capas**

Valorado en  
**34,95€**

POR  
**8,50** €/u

Unidades limitadas  
**Ref: PRPK141**



## OCTOOP® Detector de caries

Ayuda a identificar y eliminar la dentina cariada. Permite distinguir entre la capa de la dentina infectada y la sana en 10 segundos.

Bote de 5 ml

Ref: 04-022

**NUEVA PRESENTACIÓN**

**16,10** €/u  
~~47,20~~ €/u.



## Sellador de fisuras Clarben

Para el sellado de fosas y fisuras. Fotopolimerizable.

4 Jeringas de 1,2 mL  
 8 Cánulas especiales

Ref: 04-003

**1+1**  
**PRECIO RESULTANTE**  
**17,50** €/u  
 Por 1: **35,00** €/u.  
~~62,00~~ €/u



## Clarben MIRRORS Espejos

Espejos dentales planos para la exploración bucal y retractor de mejilla. Rosca americana. S. S.

Caja con 12 espejos

Nº 4 22 mm **Ref: 12-001**  
 Nº 5 24 mm **Ref: 12-002**

**4,60** €/u  
~~22,70~~ €/u.



## PROFEX® Pasta para profilaxis

Pasta de profilaxis con flúor, abrasividad media y sabor a menta.

Bote de 100 g  
 Ref: 06-005

**2,60** €/u  
~~14,50~~ €/u.



# PACK TERMÓMETRO CLÍNICO

1 Adhesivo Octobond® LC	47,40€
2 Aplicadores punta fina Octobrush®	50,50€
2 Composite Octolight® A2 (4 g)	112,70€
1 Ácido Octacid® Jumbo	147,90€
<b>1 Termómetro clínico de Infrarrojos</b>	<b>89,90€</b>

Valor pack: ~~448,40€~~

# 169'00€

Ref: PRPK117



Medición entre 32°-42°  
Automedición en 30"  
Pantalla LCD

**SÚPER PRECIO**

Unidades limitadas

# PACK ECOVAC

1 Ácido Octacid® Jumbo	147,90€
1 Composite Octolight® A3 (4 g)	56,35€
1 Composite Octolight® A2 (4 g)	56,35€
2 Planchas Mouthguard 1 mm (12 uds/caja)	42,60€
<b>1 Ecovac</b>	<b>361,40€</b>

Valor pack: ~~664,60€~~

# 195'00€

Ref: PRPK65



**SÚPER PRECIO**

Unidades limitadas

## BLANQUEAMIENTOS



2 Jeringas de 2,5 mL  
1 Jeringa de 3g protector gingival

Accesorios

Ref: 04-041

**67,50** €/u  
~~166,45~~ €/u.



Kit para paciente:  
5 Jeringas de 3 mL de GEL SNOW SMILE®  
2 Planchas  
1 Porta-planchas  
1 Guía de color

Ref: 04-043

**45,00** €/u  
~~66,25~~ €/u.

Comprando  
**3** Blanqueamientos  
**Snow Smile®**  
ó  
**2** Blanqueamientos  
**Clarben Bleach Material**  
Ilévese  
**1** Lámpara Led Clear

**POR**  
**10,00** €/u

Valorada en  
**342,45€**



Unidades limitadas

Ref: PRPK160

## PLANCHAS TERMOPLÁSTICAS Clarben

Coping 0,5mm (50 u.)

Ref: 09-052

**19,45** €/u ~~28,60~~ €/u.



Clear 1mm (25 u.)

Ref: 09-041

**16,85** €/u ~~24,80~~ €/u.



Clear 1,5mm (25 u.)

Ref: 09-042

**17,25** €/u ~~28,05~~ €/u.



Temporary Splint 0,5mm (50 u.)

Ref: 09-040

**17,90** €/u ~~30,20~~ €/u.



Mouthguard 1mm (12 u.)

Ref: 09-048

**15,55** €/u ~~21,30~~ €/u.

Mouthguard 2mm (12 u.)

Ref: 09-050

**16,35** €/u ~~24,80~~ €/u.

Mouthguard 1,5mm (12 u.)

Ref: 09-049

**16,00** €/u ~~21,30~~ €/u.

Mouthguard 3mm (12 u.)

Ref: 09-051

**16,90** €/u ~~28,05~~ €/u.



## SUTURAS OCTOSUTUR® Clarben

### SEDA NEGRA TRENZADA

Hilos de seda trenzada procedentes de filamentos de gusano de seda Bombyx mori L. Seda de color negro.

Caja 12 unidades



**14,15** €/u  
~~26,05~~ €/u.

### NYLON MONOFILAMENTO

Sutura quirúrgica no absorbible de origen sintético. Hilos de poliamida, color azul. Monofilamento de superficie lisa y uniforme que permite deslizamiento atraumático a través de los tejidos.

Caja 12 unidades



**28,50** €/u  
~~37,15~~ €/u.

\* Consulte las referencias en [www.clarben.com](http://www.clarben.com).

## CUBETAS de fluorización Clarben



Bolsa 50 unidades dobles.

Ref: 06-024 Amarillas (pequeñas)

Ref: 06-025 Blancas (medianas)

Ref: 06-026 Azules (grandes)

**13,55** €/u  
~~42,60~~ €/u.

Comprando

**1** Bolsa de **Cubetas**.

Ilévase

**1** Gel de flúor a elegir

POR  
**6,95** €/u

Unidades limitadas



Valorado en 38,05€

Ref: PRPK66

## SNOW SMILE® Blanqueamiento paciente

**Peróxido de carbamida al 16%**



Kit para paciente:  
5 Jeringas de 3 mL  
de GEL SNOW SMILE®  
2 Planchas  
1 Porta-planchas  
1 Guía de color  
Ref: 04-043

**46,45** €/u  
~~66,20 €/u.~~



Comprando  
**2** Blanqueamiento  
**Snow Smile®**

llévase

**1** Caja (50 uds)  
Mascarillas higiénicas

Valorado en  
26,90€

**POR**  
**4,50** €/u

Máximo 3 packs.  
Unidades limitadas

Ref: PRPK139

## Clarben Bleach Material® Blanqueamiento clínica

**Peróxido de hidrógeno al 38%**



2 Jeringas de 2,5 mL  
1 Jeringa de 3g protector gingival  
Accesorios  
Ref: 04-041

**71,20** €/u  
~~174,45 €/u.~~



Comprando  
**1** Blanqueamiento  
**Clarben Bleach Material®**

llévase

**Lactedin® Superficies**  
**Spray 600ml**

Máximo 2 sprays

Valorado en  
22,60€

**POR**  
**3,50** €/u

Máximo 3 packs.  
Unidades limitadas

Ref: PRPK138

## Pasta para profilaxis **PROFEX®**

Pasta en copitas individuales para limpieza y pulido de piezas dentales favoreciendo la eliminación de manchas y capas gruesas de placa. **Contiene flúor. Sin gluten. Libre de salpicaduras:** mayor higiene para el profesional y el paciente. Incluye **anillo porta-copitas**.

Sabor cereza.

100 copitas de 2 g.

Ref: 06-006 Abrasividad media  
Ref: 06-007 Abrasividad alta



**18,85** €/u  
~~40,80 €/u.~~

Comprando

**1** Caja de **PROFEX®**

llévase

**1** Inserto Ultrasonido

Modelo EMS ó SATELEC

Valorado en  
41,15€

**POR**  
**3,00** €/u



Unidades limitadas

Ref: PRPK124

# EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

## GAFAS DE PROTECCIÓN GOGGLE

Gafas certificadas, especialmente diseñadas para la protección ocular ante riesgos biológicos y de gotas o salpicaduras de líquidos, químicos y contraimpacto de partículas a alta velocidad



POR  
**7,50** €/u

Ref: 14-010

## GEL HIDROALCOHÓLICO

Gel hidroalcohólico higienizante de manos sin necesidad de agua



Bote de 500 ml

POR  
**5,95** €/u



Bote de 250 ml

POR  
**5,25** €/u

## Mascarillas quirúrgicas IIR



Caja (50 uds)

Mascarillas quirúrgicas IIR

Ref: 14-005

**0,55** €/u

CAJA 50 UDS  
27,50 €/u.

MÁXIMO 10 CAJAS POR GABINETE

ENSAYO	TIPO I	TIPO II	TIPO IIR
Eficiencia de filtración bacteriana	≥95	≥98	≥98
Presión diferencial (Pa/cm <sup>2</sup> )	<40	<40	<0
Presión de resistencia a salpicaduras (kPa)	No requerido	No requerido	≥16,0
Limpieza microbiana (ufc/g)	<30	<30	<30

## MASCARILLAS FFP2

Filtra el 95% de las partículas. Caja de 10 mascarillas.

Ref: 14-001



POR  
**2,70** €/u

MÁXIMO 10 CAJAS POR GABINETE

## BATAS ESTÉRILES

Bata estéril quirúrgica. Transpirable e impermeable.



POR  
**12,50** €/u

Unidades limitadas

Ref: 14-016

## BATAS DESECHABLES

Bata desechable de tejido no tejido, desechable e impermeable ideal para la protección personal. Protege de contaminación, humo, polvo e irritantes nocivos. Bata de uso personal.



POR  
**4,95** €/u

Unidades limitadas

Ref: 14-014